

# 1 Conditionnement par un évènement

## 1.1 Probabilité conditionnelle

### Définition : Probabilité conditionnelle

On considère un univers  $\Omega$  et  $A$  un évènement de  $\Omega$  tel que  $P(A) \neq 0$ .

On définit sur  $\Omega$  une nouvelle probabilité, notée  $P_A$ , et pour tout évènement  $B$ , on appelle **probabilité de  $B$  sachant  $A$**  et on note  $P_A(B)$ , le quotient :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

### Méthode : Calculer une probabilité conditionnelle (Formule)

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

$A$  : « le résultat est un pique ».

$B$  : « le résultat est un roi ».

Calculer  $P_A(B)$  et  $P_B(A)$ .



.....

.....


.....

.....

.....

## 1.2 Arbre pondéré

Une expérience aléatoire peut être schématisée par un arbre pondéré dont chaque branche est affecté d'un poids qui est une probabilité.



La somme des probabilités affectées aux branches issues d'un même nœud est égale à 1 ;

La probabilité d'une intersection est le produit des probabilités affectées aux branches qui mènent à sa feuille.

**Méthode :** Construire un arbre pondéré

Un sac contient 50 boules : 20 rouges et 30 noires.  
15 boules rouges sont marquées **GAGNE !**  
9 boules noires sont marquées **GAGNE !**  
On tire au hasard une boule dans le sac.  
Construire un arbre de probabilité.



.....

.....

.....

.....

.....

## 2 Formule des probabilités totales

### 2.1 Cas de deux événements


**Propriété :** Probabilité totale avec deux événements

Si  $A$  est un événement de  $\Omega$  tel que  $P(A) \neq 0$  et  $P(A) \neq 1$ , alors pour tout événement  $B$  de  $\Omega$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) = P_A(B) \times P(A) + P_{\bar{A}}(B) \times P(\bar{A}).$$

Les événements  $A \cap B$  et  $\bar{A} \cap B$  sont incompatibles et  $B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B)$  d'où :

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$$



### 2.2 Partition

**Propriété :** Partition

$n$  événements  $A_1, A_2, \dots, A_n$  forment une partition de  $\Omega$  lorsque :

- ils sont tous de probabilité non nulle ;
- ils sont incompatibles deux à deux : pour tout  $i$  et  $j$  de  $\{1; \dots; n\}$ ,  $A_i \cap A_j = \emptyset$  ;
- leur réunion est  $\Omega$  :  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$

**Remarque**

- Un événement  $A$  de probabilité non nulle et son événement contraire  $\bar{A}$  forment une partition de  $\Omega$ .
- Si les événements  $A_1, A_2, \dots, A_n$  forment une partition de  $\Omega$  alors :

$$\sum_{i=1}^n P(A_i) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) = 1$$

## 2.3 Formule des probabilités totales

### Théorème : Formule des probabilités totales

Soit  $n$  un entier supérieur ou égal à 2.

Si  $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$  est une partition de  $\Omega$  alors pour tout événement  $B$  de  $\Omega$  :

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B) \\ &= P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B) \end{aligned}$$

### Méthode : Appliquer la formule des probabilités totales

On effectue un test sur des bovins dont 2 % sont porteurs d'une maladie.

- Si un animal est malade, le test est positif dans 85 % des cas.
- Si un animal est sain, le test est négatif dans 95 % des cas.

$M$  : « le bovin est malade ».

$T$  : « le test est positif ».

Un animal est choisi au hasard.

Calculer  $P(T)$  et  $P_T(M)$ .



-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

## 3 Indépendance

### Définition : Indépendance de deux événements

On dit que deux événements  $A$  et  $B$  sont **indépendants** lorsque :  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

Lorsque deux événements  $A$  et  $B$  (de probabilités non nulles) sont **indépendants**, la réalisation (ou non) de l'un n'a pas d'influence sur la probabilité de réalisation de l'autre.

On a alors :  $P_B(A) = P(A)$  et  $P_A(B) = P(B)$ .

### Propriété

Si  $A$  et  $B$  sont deux événements indépendants alors  $\bar{A}$  et  $B$  le sont également.

**Méthode :** Démontrer l'indépendance entre deux événements

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.  
 $R$  : « on tire un roi ».       $T$  : « on tire un trèfle ».  
Les événements  $R$  et  $T$  sont-ils indépendants ?  
Même question si on ajoute deux jokers dans le jeu.



-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

## 4 Succession de deux épreuves indépendantes

Dans le cas où une expérience est constituée de deux épreuves indépendantes, on peut déterminer la probabilité des différentes issues à l'aide d'un arbre ou d'un tableau.

Comme les deux épreuves sont indépendantes, sur l'arbre pondéré, les branches du second niveau ne dépendent pas du résultat des branches du premier niveau.

**Méthode :** Calculer une probabilité à deux épreuves à l'aide d'un arbre (2)

On tire au hasard et avec remise une boule de l'urne deux fois de suite. Dans celle-ci, il y a 3 boules noires et 2 boules rouges.  
Déterminer la probabilité d'obtenir :

- a.** 2 boules noires.
- b.** 1 boule noire et une boule rouge.



-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----