MATHÉMATIQUES

Orthogonalité et distances dans l'espace : entraînement savoir-faire 2 (corrigé)

Exercice 1

Le cours

Un vecteur $\vec{n}$ est normal à un plan $\mathcal{P}$ lorsqu'il est non nul et orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de $\mathcal{P}$.

Les faces $ABFE$ et $BCGF$ étant des carrés, le vecteur $\vec{FB}$ est orthogonal aux vecteurs $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$ qui sont deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) . Ainsi, $\vec{FB}$ est un vecteur normal au plan (ABC) . On peut aussi dire que la droite (FB) est orthogonale au plan (ABC) .

Exercice 2

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires (leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles) donc on peut définir le plan $(\mathcal{P})$ engendré par A , $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

De plus, $\vec{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

On a $\vec{AB} \cdot \vec{u} = -3 \times 1 + (-1) \times (-1) + 1 \times 2 = 0$.

et $\vec{AB} \cdot \vec{v} = -3 \times 0 + (-1) \times (-1) + 1 \times (-1) = 0$.

Ainsi, $\vec{AB}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ donc $\vec{AB}$ est un vecteur normal au plan $(\mathcal{P})$.

Exercice 3

1. On a $\vec{AB} \begin{pmatrix} -1-1 \\ 3-2 \\ 1+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} 2-1 \\ 0-2 \\ -2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Méthode

Pour démontrer que trois points définissent un plan, on prouve que ces points ne sont pas alignés.

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires car les triplets $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ne sont pas proportionnels.

Les points A , B et C ne sont pas alignés : ils définissent bien un plan.

2. Soit $\vec{n}(a; b; c)$ un vecteur normal au plan (ABC) .

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires.

Or on cherche un vecteur $\vec{n}$ tel que $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 0$.

$$\begin{cases} -2a + b + 3c = 0 \\ a - 2b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2b \\ -2a + b + 3c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2b \\ -4b + b + 3c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = 2b \\ -3b + 3c = 0 \end{cases}$$

$$\text{Donc } \begin{cases} a = 2b \\ c = b \end{cases}$$

Donc $a = 2b = 2c$.

En posant $c = 1$, on obtient $b = 1$ et $a = 2$.

Ainsi on a $\vec{n}(2; 1; 1)$.

Méthode

Deux équations pour trois inconnues : on fixe une inconnue (ici b et on exprime les deux autres a et c en fonction de b . Ce système a une infinité de solution. En choisissant $c = 2$, on obtient un autre triplet possible.

Exercice 4

1. On a $\vec{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{AC} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$. Les coordonnées de ces vecteurs ne sont pas proportionnelles, on en déduit que les points A , B et C ne sont pas alignés et donc que les points A , B et C définissent un plan.

2. On a $\vec{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{DC} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$

Donc le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.

Comme $\vec{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, on a $\vec{AB} \cdot \vec{BC} = -1 \times (-1) + 3 \times (-1) + 1 \times 2 = 0$. On en déduit que les vecteurs sont orthogonaux et par suite que $ABCD$ est un rectangle.

3. a. $\vec{SM} \cdot \vec{n} = \vec{SH} \cdot \vec{n}$ car H est le projeté orthogonal de M sur (SH) .

Parallélogramme/rectangle

Pour montrer qu'un quadrilatère est un rectangle, on commence par montrer que c'est un parallélogramme, puis on montre que ce parallélogramme a un angle droit. N'oubliez pas : $ABCD$ est un parallélogramme ssi $\vec{AB} = \vec{DC}$.

$$\vec{SH} \cdot \vec{n} = \begin{cases} SH \times \|\vec{n}\| & \text{si } \vec{SH} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires de même sens} \\ -SH \times \|\vec{n}\| & \text{si } \vec{SH} \text{ et } \vec{n} \text{ sont colinéaires de sens contraire} \end{cases}$$

on a donc : $|\vec{SH} \cdot \vec{n}| = SH \times \|\vec{n}\|$. Ainsi,

$$SH = \frac{|\vec{SM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Rappel ?

Valeur absolue de truc est égal à + ou - truc.

En mathématiques, cela donne :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- b. • $\vec{n} \cdot \vec{AB} = 7 \times (-1) + 1 \times 3 + 4 \times 1 = 0$
 • $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 7 \times (-2) + 1 \times 2 + 4 \times 3 = 0$.
 On en déduit que $\vec{n}$ est un vecteur normal du plan (ABC) .

Vecteur normal : méthode

$\vec{n}$ est un vecteur normal du plan (ABC) si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de la direction du plan (ABC) .

c. $\|\vec{n}\| = \sqrt{7^2 + 1^2 + 4^2} = \sqrt{66}$

Norme d'un vecteur

$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ alors $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

On a $\vec{SA} \begin{pmatrix} -1,5 \\ 1,5 \\ -6 \end{pmatrix}$ et donc $\vec{SA} \cdot \vec{n} = -1,5 \times 7 + 1,5 \times 1 + (-6) \times 4 = -33$.

Par conséquent : $SH = \frac{|\vec{SA} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|} = \frac{|-33|}{\underbrace{\sqrt{66}}_2} = \frac{\sqrt{66}}{2}$.
passage technique :-)

Remarque qui a son importance

On a choisi $M = A$ dans la formule. On pouvait choisir $M = B$ ou $M = C$... même résultat évidemment.

- d. On a $AB = \sqrt{(-1)^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{11}$ et $BC = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$.
 Comme $ABCD$ est un rectangle $\mathcal{A}_{ABCD} = AB \times BC = \sqrt{11} \times \sqrt{6} = \sqrt{66}$.
 Le volume de la pyramide est donc donnée par :

$$V_{SABCD} = \frac{\mathcal{A}_{ABCD} \times SH}{3} = \frac{\sqrt{66} \times \frac{\sqrt{66}}{2}}{3 \times 2} = \frac{66}{6} = 11$$

Volume d'une pyramide

$\frac{1}{3} \times$ Aire de la base $\times$ hauteur.